

Studio Dentistico Associato Astigiano

Prof. Enrico Gherlone Direttore Servizio Odontoiatria HSR Milano
Dott. Milvio Magnani Spec. Odontostomatologia
Dott. Salvatore Puleto odontoiatra
Dott.ssa Maria Teresa Sberna Spec. Odontostomatologia

Stradale Asti-Ivrea, 9 Fraz. S. Anna – 14026 – Montiglio (AT)
Tel. 0141.994151

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E CONSENSO AD INTERVENTO DI CHIRURGIA ORALE PER AVULSIONE DEL TERZO MOLARE.

Sig. / Sig.^{ra}

Gentile Paziente, con questo modulo si riassumono i concetti relativi al suo trattamento già oralmente espressi nel corso della visita, in modo da avere, anche per iscritto, il Suo assenso alla esecuzione delle terapie preventivate come previsto dal nuovo Codice Deontologico.

Diagnosi: Disodontiasi del terzo molare in inclusione parziale (osteo-mucosa) o totale (ossea)

Descrizione dell'intervento

Eliminazione di una patologia in atto attraverso un intervento chirurgico locale. Estrazione di uno o più denti inclusi o semi-inclusi con possibile apertura di un lembo di accesso mucoso e relativa sutura.

Benefici dell'intervento

L'avulsione del terzo molare si può rendere necessaria per evitare processi infiammatori, il danneggiamento dei denti adiacenti o per necessità ortodontiche.

Rischi dell'intervento

Come per tutti gli interventi chirurgici esistono dei rischi relativi :

- all'impiego *inevitabile* di anestetico locale, con vasocostrittore o senza, a cui alcuni soggetti possono risultare particolarmente sensibili per allergie, patologie renali, cardiache, endocrine o stato di gravidanza;
- alla possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici ;
- a possibili lesioni ossee o parodontali; si possono altresì raramente ledere strutture quali il nervo alveolare inferiore (con susseguenti parestesie, anestesia, ecc.) o il seno mascellare in relazione a contiguità anatomiche di queste strutture. Le lesioni neurologiche sono nella maggioranza dei casi parziali e si ha una buona risoluzione della sintomatologia nel lungo termine quando adeguatamente trattate.

Complicanze

Dopo l'intervento è possibile avere dolore, tumefazione, infezione, infiammazione o emorragia facilmente controllabili. Raramente si verifica una temporanea impotenza funzionale ed un rialzo della temperatura.

Le complicanze si riducono notevolmente seguendo scrupolosamente le indicazioni del proprio dentista.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato e di aver compreso lo scopo e la natura degli atti di chirurgia orale indicati nel presente modulo, e di avere altresì consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrebbero derivare.

Presto pertanto il mio assenso alle terapie che mi sono state illustrate e spiegate.

FIRMA.....

DATA.....